

БРОПАННА

очень ранний сорт,
предназначенный для
преждевременного
проращивания



Сорт БРОПАННА предрасположен к прорастанию, что ведет к интенсивному образованию ботвы и быстрому формированию клубней. Кожура клубней быстро становится крепкой.

ОПИСАНИЕ СОРТА

КАЧЕСТВО

преимущественно нерассыпчатый; обладает отличными вкусовыми качествами; жёлтая мякоть (даже после варки); низкая склонность к образованию тёмных пятен на мякоти; содержание крахмала 12 – 13 %

УРОЖАЙНОСТЬ

высокая урожайность с большим выходом товарных клубней при ранней копке; выгодная калибровка, формирование большого количества клубней с куста;

УСТОЙЧИВОСТЬ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| › Нематоды | Ro 1, 4 |
| › Y-Вирус | хорошая-очень хорошая |
| › Рак картофеля | патотип 1 |
| › Вирус скручивания листьев | хорошая |
| › Фитофтороз | хорошая-очень хорошая |
| › Парша | очень хорошая |

КЛУБЕНЬ

округло-овальная форма; поверхностное залегание глазков; гладкая светлая кожура; жёлтая мякоть;

КУСТ

стеблевой тип; образует красно-фиолетовые цветки; быстрые всходы и стремительное формирование ботвы;

ПОСАДКА

при возделывании подходит для всех видов почв; короткий период покоя клубней; при посадке не использовать клубни с обломленным световым ростком, в противном случае это приведёт к формированию

большого количества мелких клубней; рекомендуется протравливание против ризоктониоза; расстояние при посадке (в случае, если расстояние между рядками 75 см)-33 см; средняя глубина посадки;

УДОБРЕНИЯ

азотные удобрения: аналогично, что и у других ранних сортов – одноразовое внесение примерно 160 кг/га N, включая реминерализирующий азот и азот, полученный в процессе распада органического вещества в почве; фосфорные удобрения: 100 кг/га; калийные удобрения: 250 кг/га, в зависимости от ожидаемого урожая; 60 кг/га Mg; рекомендуются листовые подкормки микроэлементами;

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

не чувствителен к метрибуцину; использование метрибуцина в послевсходовой фазе в низкой дозировке; рекомендуется стандартное опрыскивание против фитофтороза

ОРОШЕНИЕ

для равномерного роста и развития ботвы в засушливые периоды рекомендуется полив; за 2 недели до десикации ботвы прекратить полив, для того, чтобы повысить содержание крахмала в клубнях и легче удалить ботву;

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

БРОПАННА-ранний сорт и уже через 80 – 90 дней после всходов возможна копка; обращать внимание на щадящую копку; при длительном хранении рекомендуются хранилища с охлаждающими установками

Данное описание сорта было создано самым тщательным образом. Однако мы не несем юридической ответственности за несоответствие данной информации действительности, так как картофель - это натуральный продукт природного происхождения. Сорт БРОПАННА был создан традиционным способом, без использования генетически модифицированных методов.

Bavaria-Saat Vertriebs GmbH

Кёнигслахенер Берг 14, 86529 Шробенгаузен, www.bavaria-saat.de

Тел +49 (0)8252 906969, Факс +49 (0)8252 883882, E-mail info@bavaria-saat.de